



Farmacéuticos

Consejo General de Colegios Farmacéuticos

Vocalía Nacional de
Farmacia Hospitalaria

Vocalía Nacional de
Oficina de Farmacia

Paxlovid®

Cuándo y cómo utilizarlo

Versión: 30 de mayo de 2022

¿Qué es?

Paxlovid® es un nuevo medicamento de administración oral indicado para el tratamiento de la COVID-19.

En cada envase de Paxlovid® encontraremos **comprimidos rosas** con 150 mg de nirmatrelvir (PF-07321332) y **comprimidos blancos** con 100 mg de ritonavir.

Nirmatrelvir **impide la multiplicación del virus en nuestras células**, mientras que ritonavir potencia y prolonga los efectos de nirmatrelvir.



¿A qué pacientes va dirigido?

Paxlovid® está indicado en personas mayores de 18 años, con COVID leve a moderada, que no requieran aporte de oxígeno suplementario, y que tengan un elevado riesgo de progresar a COVID-19 grave. Según los criterios para valorar la administración de las nuevas alternativas terapéuticas antivirales frente a la infección por SARS-CoV-2, publicados por la AEMPS y actualizados a fecha de 30 de mayo de 2022, su empleo debe priorizarse en los siguientes pacientes:

1. Personas no vacunadas* > **80 años**.

2. Personas no vacunadas* > **65 años y con al menos un factor de riesgo de progresión****

3. Personas vacunadas (> 6 meses) con > **80 años y con al menos un factor de riesgo para progresión****

4. Personas **inmunodeprimidas** con condiciones de alto riesgo independientemente de su estado de vacunación.



* Personas que no han recibido la pauta de vacunación completa (incluidas las dosis de recuerdo) y no han padecido la enfermedad en los 3 últimos meses.

** Se consideran factores de riesgo de progresión:

- Enfermedad renal crónica
- Enfermedad hepática crónica
- Enfermedad neurológica
- Enfermedades cardiovasculares
- EPOC
- Diabetes con afectación de órgano diana
- Obesidad (IMC≥35)

Su empleo en el paciente requiere una **validación farmacéutica previa a su dispensación**.



Importante: el tratamiento debe iniciarse en los primeros 5 días tras el diagnóstico de COVID-19.

Un inicio posterior puede reducir la eficacia del mismo.

Posología

En caso de que te lo prescriba un médico, la dosis que debes utilizar es de **dos comprimidos de nirmatrelvir** (comprimidos rosas) **más un comprimido de ritonavir** (comprimidos blancos) **cada 12 horas, durante 5 días.**

El tratamiento debe completarse aunque hayas empeorado y sea necesario que seas ingresado.


Si olvidas tomar una dosis y han pasado menos de 8 horas, tómala cuanto antes y continúa el tratamiento a las horas programadas. **Si han pasado más de 8 horas**, omite la dosis olvidada y continúa el tratamiento a las horas habituales. Nunca dupliques una dosis para compensar una dosis olvidada.

Si padeces una enfermedad del riñón, consulta a tu médico y/o farmacéutico la dosis que tienes que utilizar.

Interacciones

El principal riesgo de Paxlovid® se debe a su posibilidad de dar lugar a interacciones farmacológicas, potenciando la toxicidad de otros medicamentos que pudieras estar tomando, tales como analgésicos, antitumorales, antiarrítmicos, antiepilépticos, antipsicóticos, fármacos para la alergia, el colesterol, la disfunción eréctil, el tratamiento de enfermedades de la próstata y sedantes, entre otros.

Por tanto, antes de empezar el tratamiento, informa a tu médico y/o farmacéutico de todos los medicamentos (incluyendo plantas medicinales) y complementos alimenticios que estás tomando.



No suspendas ningún medicamento si vas a empezar a tomar Paxlovid® sin que te lo indique tu médico, o tu farmacéutico en caso de medicamentos sin receta

Reacciones adversas



Paxlovid® suele ser bien tolerado, y sólo se han registrado casos relativamente frecuentes de vómitos, diarrea, dolor de cabeza y alteraciones del gusto.

Informa a tu médico y/o farmacéutico

si experimentas estos síntomas u otros diferentes.

Igualmente, puedes notificar estos síntomas al [Sistema Español de Farmacovigilancia](#).

